

Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014

Pierandrea Brichetti^{1*}, Giancarlo Fracasso²

Riassunto: La presente check-list segue la sequenza sistematica della IOC World Bird List (Gill & Donsker, 2015) e adotta fondamentalmente le stesse categorie fenologiche già utilizzate in check-list regionali e nazionali analoghe ed in particolare in Brichetti & Massa (1998), aggiornando quest'ultima a tutto il 2014. La check-list è in sostanziale accordo con la Lista CISO-COI (Fracasso *et al.*, 2009) e con le decisioni della Commissione Ornitologica Italiana (COI). Le specie attualmente riconosciute come appartenenti all'avifauna italiana sono 548; le variazioni numeriche rilevate nel corso degli ultimi 100 anni (483 specie nel 1913, 469 nel 1984, 500 nel 1998), in parte dovute alle differenti classificazioni seguite, evidenziano una recente tendenza all'incremento, certamente da collegare ad una maggiore copertura del territorio, sostenuta da moderni metodi di ricerca e da sempre più efficienti attrezzature, ma anche alle differenti classificazioni seguite.

Parole chiave: Avifauna italiana, check-list, fenologia.

Abstract: Check-list of Italian Birds, updated to the end of 2014.

We provide a check-list of Italian birds with major emphasis on the phenological categorization of each taxon, following the approach and updating the results of an analogous list previously published (Brichetti & Massa, 1998). In this list we based on the IOC World Bird List (Gill & Donsker, 2015) for nomenclature, species sequence and higher level taxonomy (from genus to order). This compilation takes into account the decisions made by the Italian Ornithological Commission (COI) and includes 548 species, recorded in Italy until the end of 2014.

Key words: Italian avifauna, Check-list, Phenology.

INTRODUZIONE

Nel corso del XX secolo la prima check-list tradizionale che sinteticamente definisce la fenologia dei vari taxa segnalati nel territorio nazionale risale al 1913, quando Ar-

rigoni degli Oddi pubblica un «Elenco degli Uccelli italiani per conoscere a prima vista lo stato esatto di ogni specie». Per un secondo analogo inventario bisogna attendere il 1945, quando Moltoni redige un «Elenco degli Uccelli italiani con l'attuale nome scientifico e relativa pronuncia in riguardo all'accento», nel quale vengono considerate anche le sottospecie. La lista successiva viene pubblicata da Moltoni e Brichetti nel 1978 con il titolo «Elenco degli Uccelli italiani», anche in questo caso comprendente le categorie infraspecifiche; classificazione sistematica e nomenclatura scientifica seguita sono quelle proposte da Vaurie (1959; 1965). Nel 1984 Brichetti e Massa redigono una «Check-list degli uccelli italiani», che manterranno poi aggiornata per circa 15 anni, pubblicando nel 1987 e nel 1991 delle «Aggiunte e rettifiche alla check-list degli uccelli italiani» e nel 1998 una nuova «Check-list degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997»; classificazione sistematica e nomenclatura scientifica si basano, con aggiornamenti progressivi, sulla revisione di Voous (1973; 1977).

Più di recente, a partire dal 2003, Brichetti e Fracasso nell'ambito dei 9 volumi dell'Ornitologia Italiana aggiornano, per gruppi sistematici, la lista italiana, inserendo nell'ultimo (2015) una lista completa aggiornata a tutto il 2014 (vedasi NOTE). Nel 2009 Fracasso *et al.* pubblicano «La Lista CISO-COI degli Uccelli italiani - Parte prima: liste A, B e C», cui fa seguito la seconda parte «Le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie “di servizio” (cat. D, E, X)» (Baccetti *et al.*, 2014); la categorizzazione utilizzata in queste liste segue in parte le indicazioni dell'Association of European Records and Rarities Committees (AERC), discostandosi sostanzialmente da quella fenologica tradizionale.

Per questo motivo riteniamo utile pubblicare questa nuova lista aggiornata a tutto il 2014 su un periodico ad ampia diffusione, pensando di fare cosa gradita a quanti intendano utilizzare le categorie fenologiche “tradizionali”, adottate nella maggior parte delle check-list nazionali e regionali.

L'elaborazione di una classificazione degli organismi che rispecchiasse nel modo più accurato possibile quello che il pensiero umano di volta in volta ha ritenuto essere l'ordinamento “naturale” degli esseri viventi, è stato da lungo tempo uno degli obiettivi da un lato, e all'inizio pressoché esclusivamente, della speculazione filosofica,

¹ Centro Italiano Studi Ornitologici ONLUS, Dipartimento DEMETRA dell'Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze, Edificio 4, 90128 Palermo, Italia.

² Gruppo di studi naturalistici “nisoria”, c/o Museo naturalistico archeologico, Contrà S. Corona 4, 36100 Vicenza, Italia.
E-mail: giancarlo.fracasso@alice.it

*Corresponding author: pbrichetti@alice.it

© Pierandrea Brichetti, Giancarlo Fracasso 2015

Received: April 25, 2015

Accepted for publication: December 11, 2015

dall'altro della ricerca scientifica in senso stretto, soprattutto dal momento in cui quest'ultima ha assunto una ben definita autonomia e si è via via organizzata in discipline sempre più circoscritte e specializzate. In questo ormai lungo e travagliato percorso, lungo il quale hanno visto la luce una grande quantità di schemi classificatori tra loro spesso fortemente divergenti (per alcune parziali elencazioni comparative, relative alla Classe Uccelli ed al di sopra del livello di Genere, vedi per esempio Walters, 2003 e Brichetti & Fracasso, 2015, mentre per un'esauriva, sebbene molto sintetica, rassegna storica vedi Bruce, 2003), è sempre stata sentita l'esigenza di una condizione di relativa "stabilità", istanza che, se non espressa esplicitamente da parte dei tassonomi stessi, viene tuttora manifestata soprattutto da chi utilizza la classificazione di un gruppo qualsiasi di organismi come supporto operativo sia all'interno di altri filoni di ricerca, sia per scopi decisamente più pragmatici, che spaziano dall'ordinamento delle collezioni museali, alla compilazione di manuali tecnici, alla predisposizione di apparati normativi in campo gestionale (Mayr & Bock, 1994; Collinson, 2001; Padià & De La Riva, 2006).

In effetti, l'indagine sistematica, non solo in campo ornitologico, ha attraversato fasi di relativa tranquillità, alternate a periodi di maggiore dinamismo, di solito in concomitanza con profonde innovazioni nel campo teorico-speculativo ed in quello metodologico. Proprio questi ultimissimi anni rappresentano una di queste fasi di vivace fermento, grazie soprattutto ai rapidi sviluppi della ricerca biomolecolare che, supportata da strumenti analitici sempre più sofisticati, quasi quotidianamente propone nuove ricostruzioni filogenetiche di raggruppamenti tassonomici a vari livelli gerarchici, spesso con rilevanti conseguenze per quanto concerne l'ordinamento e la nomenclatura dei taxa coinvolti. Nonostante le recenti e lodevoli iniziative, a stampa e/o online, di alcune importanti organizzazioni internazionali (International Ornithologists' Union, BirdLife International, Trust for Avian Systematics ecc.) composte da specialisti del settore ed impegnate nel redigere liste sistematiche dell'intera Classe degli Uccelli, scientificamente solide e continuamente aggiornate in base alle pubblicazioni che continuamente vedono la luce, risulta difficile per i "non-addetti ai lavori" orientarsi di fronte ai risultati concreti di tali elaborazioni che risultano ancora in parte discordanti.

Per quanto concerne la nomenclatura nel compilare questa lista dell'avifauna italiana ci siamo basati sostanzialmente su tre fonti molto recenti e che riteniamo particolarmente accreditate, adottando nella maggior parte dei casi discordanti l'opzione maggioritaria: la IV edizione dell'ormai classica «Howard & Moore» (Dickinson & Reamsen Jr., 2013; Dickinson & Christidis, 2014), l'«Handbook of the Birds of the World» (del Hoyo & Collar, 2014 per i non-Passeriformi, del Hoyo *et al.*, 2003-2011 per i Passeriformi, con aggiornamenti online fino al 2015) e la «IOC World Bird List» (Gill & Donsker 2015, solo online): quest'ultima lista è stato il riferimento esclusivo per la sequenza sistematica.

La presente check-list è comunque in sostanziale accordo con le liste CISO-COI, che utilizzano la categorizzazione proposta dall'AERC, integrata da altre categorie

riguardanti lo status generale e riproduttivo (Fracasso *et al.*, 2009; Baccetti *et al.*, 2014). In accordo con queste ultime liste, le segnalazioni, in precedenza ritenute da confermare come accidentali nei rispettivi volumi dell'Ornitologia Italiana, sono state rivalutate (per es. *Cairina moschata*, *Porphyrio martinicus*, *Alaemon alaudipes*) o escluse (*Bulweria fallax*). D'altro canto viene proposta la rivalutazione di *Anas americana* per mancanza di elementi concreti che possano far pensare ad una eventuale origine non naturale degli individui segnalati in Italia e per le numerose segnalazioni accettate in diversi Paesi europei.

Per le specie che necessitano di ulteriori dettagli vengono riportate alla fine della lista le relative Note (indicate con *). Per le specie estinte si indica solo l'ultima regione di presenza.

TERMINI FENOLOGICI

I termini fenologici, con relative abbreviazioni, tratti da Fasola & Brichetti (1984), sono stati lievemente modificati rispetto alle liste precedenti. È stato infatti introdotto il termine "Naturalizzata", mentre il termine "regolare" viene omesso per tutte le categorie, tranne quando si riferisce a situazioni incerte. Inoltre non viene più utilizzata la categoria "Accidentale da confermare".

B = Nidificante (Breeding): la specie nidificante sedentaria viene indicata con **SB**, quella migratrice (o "estiva") con **M, B**, mentre nelle specie con popolazioni parzialmente sedentarie e migratrici il simbolo **B** viene posto all'inizio. Per le specie estinte viene indicata l'ultima regione di presenza certa. I casi di nidificazione occasionali (generalmente inferiori a mezza dozzina), escludendo quelli ante 1950, vengono indicati con **B irr**. In sintesi, con **B, M, W** vengono indicate specie nidificanti e svernanti, con popolazioni parzialmente sedentarie e altre migratrici; con **M, B, W** specie migratrici e nidificanti, con locali popolazioni svernanti; con **M, W, B** specie migratrici e svernanti, con locali popolazioni nidificanti.

S = Sedentaria o Stazionaria (Sedentary, Resident): viene sempre abbinato a **B**. Specie presente per tutto o gran parte dell'anno in un determinato territorio, dove normalmente porta a termine il ciclo riproduttivo; la sedentarietà non esclude movimenti di una certa portata (per es. erratismi stagionali, verticali).

N = Naturalizzata (Naturalized): viene abbinato a **B**. Specie introdotta in tempi recenti e presente allo stato selvatico con popolazioni nidificanti stabili in grado di autosostenersi e di diffondersi spontaneamente. Il simbolo non viene utilizzato per le specie para-autoctone, introdotte e naturalizzate ante 1500 (per es. *Phasianus colchicus*, *Alectoris barbara*) o per quelle presumibilmente già presenti in tempi storici (per es. *Anser anser*).

(N) = Naturalizzata da confermare (Uncertain Naturalized): viene abbinato a **B**. Specie introdotta in tempi recenti e localmente acclimatata come nidificante ma non ancora da considerare naturalizzata in quanto presente con popolazioni ancora limitate e/o localizzate.

M = Migratrice (Migratory, Migrant): specie che transita sul territorio in seguito agli spostamenti annuali dalle aree di nidificazione verso i quartieri di svernamento e/o viceversa; in questa categoria sono incluse anche specie

invasive, dispersive (per es. dispersioni giovanili) o che compiono spostamenti a corto raggio. Le specie di comparsa irregolare e/o rara o localizzata, che non rientrano nella categoria delle accidentali, vengono indicate con **M irr**.

W = Svernante (Wintering, Winter Visitor): specie presente in inverno per tutto o parte del periodo considerato (dicembre-gennaio o metà febbraio), senza escludere spostamenti locali o di rilevante portata in relazione a condizioni climatico-ambientali contingenti.

Le specie svernanti in modo saltuario o semplicemente presenti nel periodo invernale durante soste temporanee (in genere di breve durata, localizzate e limitate a singoli o pochi individui), vengono indicate con **W irr**.

A = Accidentale (Vagrant, Accidental): Specie che capita in una determinata zona in modo del tutto casuale (convenzionalmente meno di 20 volte) in genere con individui singoli o in numero molto limitato. Viene indicato il numero di segnalazioni (e non di individui) ritenute valide, in accordo con la COI. Nei casi in cui risulta difficile stabilire se si tratta di specie accidentale o migratrice

irregolare viene considerata la categoria più restrittiva. L'attributo Accidentale esclude l'abbinamento ad eventuali altre categorie fenologiche. Rispetto alle versioni precedenti la categoria Accidentale da confermare (A) non viene più utilizzata.

reg = regolare (regular): viene utilizzato solo nel caso di fenologia incerta (per es. M reg?) e indica una costante ricorrenza annuale nel tempo.

irr = irregolare (irregular): viene abbinato a tutti i simboli e indica una saltuaria ricorrenza annuale nel tempo.

? = può seguire ogni simbolo e indica generalmente un possibile cambio di categoria fenologica basato su dati incerti o presunti. Per es. M reg? indica un'apparente regolarizzazione delle comparse di una specie in precedenza ritenuta migratrice irregolare, M irr? un incremento delle comparse di una specie in precedenza accidentale, B reg? nidificazione in apparente corso di stabilizzazione.

Nell'elencazione sequenziale delle categorie fenologiche viene data precedenza a quelle riguardanti la nidificazione. Per un maggiore approfondimento delle varie categorie fenologiche cfr. Fasola & Bricchetti (1984).

ELENCO IN ORDINE SISTEMATICO

Anseriformes						
Anatidae						
1	01570	Oca granaiola	<i>Anser fabalis</i>	(Latham, 1787)	M, W	*
2	01580	Oca zamperosee	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Baillon, 1834	A - 10	
3	01610	Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W	*
4	01590	Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	(Scopoli, 1769)	M, W	
5	01600	Oca lombardella minore	<i>Anser erythropus</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr, W irr	
6	01630	Oca delle nevi	<i>Anser caerulescens</i>	(Linnaeus, 1758)	A - 2	
7	01660	Oca del Canada maggiore	<i>Branta canadensis</i>	(Linnaeus, 1758)	(BN), M irr, W irr	
8	01680	Oca colombaccio	<i>Branta bernicla</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr, W irr	
9	01670	Oca facciabianca	<i>Branta leucopsis</i>	(Bechstein, 1803)	M irr, W irr	
10	01690	Oca collarosso	<i>Branta ruficollis</i>	(Pallas, 1769)	M irr, W irr	
11	20800	Cigno nero	<i>Cygnus atratus</i>	(Latham, 1790)	(BN), M irr, W irr	
12	01520	Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	SBN, M, W	
13	01530	Cigno minore	<i>Cygnus columbianus</i>	(Ord, 1815)	M irr, W irr	
14	01540	Cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
15	01700	Oca egiziana	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	(Linnaeus, 1766)	(BN), M irr, W irr	
16	01730	Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
17	01710	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	(Pallas, 1764)	(BN), M reg?, W irr	
18	01750	Anatra muta	<i>Cairina moschata</i>	(Linnaeus, 1758)	(BN), M irr, W	
19	01780	Anatra mandarina	<i>Aix galericulata</i>	(Linnaeus, 1758)	(BN), M reg?, W reg?	
20	01820	Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W	

21	01790	Fischione	<i>Anas penelope</i>	Linnaeus, 1758	M, W, B irr	*
22	01800	Fischione americano	<i>Anas americana</i>	J. F. Gmelin, 1789	A - 3	
23	01860	Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	Linnaeus, 1758	SB, M, W	
24	01920	Marzaiola americana	<i>Anas discors</i>	Linnaeus, 1766	A - 4	
25	01940	Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	Linnaeus, 1758	M, W, B	
26	01890	Codone	<i>Anas acuta</i>	Linnaeus, 1758	M, W, B irr	
27	01910	Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W irr	
28	01830	Alzavola asiatica	<i>Anas formosa</i>	Georgi, 1775	A - 11	
29	01840	Alzavola	<i>Anas crecca</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W	
30	01842	Alzavola americana	<i>Anas carolinensis</i>	J. F. Gmelin, 1789	A - 3	
31	01950	Anatra marmorizzata	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	(Ménétries, 1832)	M, B, W irr	
32	01960	Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	(Pallas, 1773)	B, M, W	
33	01980	Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
34	02020	Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	(Güldenstädt, 1770)	B, M, W	
35	02000	Moretta dal collare	<i>Aythya collaris</i>	(Donovan, 1809)	A - 7	
36	02030	Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
37	02040	Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>	(Linnaeus, 1761)	M, W	
38	02070	Re degli edredoni	<i>Somateria spectabilis</i>	(Linnaeus, 1758)	A - 8	
39	02060	Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
40	02110	Moretta arlecchino	<i>Histrionicus histrionicus</i>	(Linnaeus, 1758)	A - 4	
41	02150	Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
42	02130	Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
43	02120	Moretta codona	<i>Clangula hyemalis</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
44	02180	Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
45	02200	Pesciaiola	<i>Mergellus albellus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
46	02230	Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	Linnaeus, 1758	SB, M, W	
47	02210	Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	Linnaeus, 1758	M, W	
48	02250	Gobbo della Giamaica	<i>Oxyura jamaicensis</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	M reg?, W	
49	02260	Gobbo rugginoso	<i>Oxyura leucocephala</i>	(Scopoli, 1769)	M irr, W irr	*
Galliformes						
Odontophoridae						
50	03450	Colino della Virginia	<i>Colinus virginianus</i>	(Linnaeus, 1758)	SBN	
Phasianidae						
51	03260	Francolino di monte	<i>Tetrastes bonasia</i>	(Linnaeus, 1758)	SB	
52	03350	Gallo cedrone	<i>Tetrao urogallus</i>	Linnaeus, 1758	SB	
53	03320	Fagiano di monte	<i>Lyrurus tetrix</i>	(Linnaeus, 1758)	SB	
54	03300	Pernice bianca	<i>Lagopus muta</i>	(Montin, 1781)	SB	
55	03570	Coturnice	<i>Alectoris graeca</i>	(Meisner, 1804)	SB	
56	03550	Coturnice orientale	<i>Alectoris chukar</i>	(J. E. Gray, 1830)	SBN	
57	03590	Pernice sarda	<i>Alectoris barbara</i>	(Bonnaterre, 1790)	SB	
58	03580	Pernice rossa	<i>Alectoris rufa</i>	(Linnaeus, 1758)	SB	
59	03640	Francolino	<i>Francolinus francolinus</i>	(Linnaeus, 1766)	SB	*
60	28010	Francolino di Erckel	<i>Pternistis erckelii</i>	(Rüppell, 1835)	SBN	
61	03670	Starna	<i>Perdix perdix</i>	(Linnaeus, 1758)	SB	
62	03700	Quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W	
63	03940	Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	Linnaeus, 1758	SB	

Gaviiformes						
Gaviidae						
64	00020	Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	(Pontoppidan, 1763)	M, W	
65	00030	Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
66	00040	Strolaga maggiore	<i>Gavia immer</i>	(Brünnich, 1764)	M reg?, W irr	
67	00050	Strolaga beccogiallo	<i>Gavia adamsii</i>	(G. R. Gray, 1859)	A - 7	
Procellariiformes						
Oceanitidae						
68	00500	Uccello delle tempeste di Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>	(Kuhl, 1820)	A - 2	
Diomedeidae						
69	00200	Albatro urlatore	<i>Diomedea dabbenena</i>	Mathews, 1929	A - 1	*
70	00140	Albatro sopracciglieneri	<i>Thalassarche melanophris</i>	(Temminck, 1828)	A - 1	*
Hydrobatidae						
71	00520	Uccello delle tempeste	<i>Hydrobates pelagicus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W	
72	00560	Uccello delle tempeste di Swinhoe	<i>Oceanodroma monorhis</i>	(Swinhoe, 1867)	A - 1	
73	00550	Uccello delle tempeste codaforecuta	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	(Vieillot, 1817)	A - 13	
Procellariidae						
74	00210	Ossifraga	<i>Macronectes giganteus</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	A - 1	
75	00220	Fulmaro	<i>Fulmarus glacialis</i>	(Linnaeus, 1761)	A - 1	
76	00230	Procellaria del Capo	<i>Daption capense</i>	(Linnaeus, 1758)	A - 1	
77	00360	Berta maggiore	<i>Calonectris diomedea</i>	(Scopoli, 1769)	M, B, W	
78	-	Berta maggiore atlantica	<i>Calonectris borealis</i>	(Cory, 1881)	A - 3 (B irr?)	*
79	00430	Berta grigia	<i>Ardenna grisea</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	A - 12	
80	00400	Berta dell'Atlantico	<i>Ardenna gravis</i>	(O'Reilly, 1818)	A - 1	
81	00462	Berta minore	<i>Puffinus yelkouan</i>	(Acerbi, 1827)	M, B, W	
82	00463	Berta balearica	<i>Puffinus mauretanicus</i>	P. R. Lowe, 1921	M	
83	00482	Berta minore fosca	<i>Puffinus baroli</i>	(Bonaparte 1857)	A - 4	*
84	00340	Berta di Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i>	(Jardine & Selby, 1828)	A - 4	
Podicipediformes						
Podicipedidae						
85	00070	Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	(Pallas, 1764)	B, M, W	
86	00100	Svasso collarosso	<i>Podiceps grisegena</i>	(Boddaert, 1783)	M, W	
87	00090	Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
88	00110	Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
89	00120	Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	C. L. Brehm, 1831	M, W, B reg?	
Phoenicopteriformes						
Phoenicopteridae						
90	01472	Fenicottero	<i>Phoenicopus roseus</i>	Pallas, 1811	B, M, W	
Ciconiiformes						
Ciconiidae						
91	01310	Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W	
92	01340	Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W	

Pelecaniformes						
Threskiornithidae						
93	01420	Ibis sacro	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	(Latham, 1790)	BN, M, W	
94	01360	Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>	(Linnaeus, 1766)	M, B, W	
95	01440	Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W	
Ardeidae						
96	00950	Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
97	00980	Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	(Linnaeus, 1766)	M, B, W irr	
98	01000	Tarabusino orientale	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	(Swinhoe, 1873)	A - 1	
99	01040	Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W	
100	01080	Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	(Scopoli, 1769)	M, B, W irr	
101	01110	Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
102	01220	Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W	
103	01240	Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	Linnaeus, 1766	M, B, W irr	
104	01210	Airone bianco maggiore	<i>Ardea alba</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W	
105	01200	Airone bianco intermedio	<i>Egretta intermedia</i>	(Wagler, 1829)	A - 1	
106	01190	Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	(Linnaeus, 1766)	M, B, W	
107	01180	Airone schistaceo	<i>Egretta gularis</i>	(Bosc, 1792)	M, W	*
Pelecanidae						
108	00880	Pellicano comune	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Linnaeus, 1758	M irr, W irr	
109	00900	Pellicano rossiccio	<i>Pelecanus rufescens</i>	J. F. Gmelin, 1789	A - >20	
110	00890	Pellicano riccio	<i>Pelecanus crispus</i>	Bruch, 1832	A - 11	
Suliformes						
Sulidae						
111	00710	Sula	<i>Morus bassanus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W, B irr	*
112	00700	Sula fosca	<i>Sula leucogaster</i>	(Boddaert, 1783)	A - 3	
Phalacrocoracidae						
113	00820	Marangone minore	<i>Microcarbo pygmeus</i>	(Pallas, 1773)	B, M, W	
114	00800	Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	(Linnaeus, 1761)	SB, M	
115	00720	Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
Accipitriformes						
Pandionidae						
116	03010	Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W, B irr	*
Accipitridae						
117	02350	Nibbio bianco	<i>Elanus caeruleus</i>	(Desfontaines, 1789)	A - 7	
118	02460	Gipeto	<i>Gypaetus barbatus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr	*
119	02470	Capovaccaio	<i>Neophron percnopterus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
120	02310	Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
121	02320	Falco pecchiaiolo orientale	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	(Temminck, 1821)	A - 1	
122	02510	Grifone	<i>Gyps fulvus</i>	(Hablizl, 1783)	SB, M, W	*
123	02550	Avvoltoio monaco	<i>Aegyptius monachus</i>	(Linnaeus, 1766)	M irr	*
124	02560	Biancone	<i>Circaetus gallicus</i>	(J. F. Gmelin, 1788)	M, B, W	
125	02920	Aquila anatraia minore	<i>Clanga pomarina</i>	(C. L. Brehm, 1831)	M, W irr	
126	02930	Aquila anatraia maggiore	<i>Clanga clanga</i>	(Pallas, 1811)	M, W	
127	02980	Aquila minore	<i>Hieraaetus pennatus</i>	(J. F. Gmelin, 1788)	M, W, B irr	*

128	02941	Aquila rapace	<i>Aquila rapax</i>	(Temminck, 1828)	A - 2	
129	02942	Aquila delle steppe	<i>Aquila nipalensis</i>	Hodgson, 1833	A - 22	
130	02950	Aquila imperiale	<i>Aquila heliaca</i>	Savigny, 1809	M irr, W irr	
131	02960	Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr	
132	02990	Aquila di Bonelli	<i>Aquila fasciata</i>	Vieillot, 1823	SB, M irr	
133	02730	Sparviere levantino	<i>Accipiter brevipes</i>	(Severtzov, 1850)	A - 8	
134	02690	Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W	
135	02670	Astore	<i>Accipiter gentilis</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W	
136	02600	Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W	
137	02610	Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>	(Linnaeus, 1766)	M, W, B irr	
138	02620	Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>	(S. G. Gmelin, 1770)	M, W irr	
139	02630	Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
140	02390	Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W	
141	02380	Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	(Boddaert, 1783)	M, B, W	
142	02430	Aquila di mare	<i>Haliaeetus albicilla</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W reg?	*
143	02900	Poiana calzata	<i>Buteo lagopus</i>	(Pontoppidan, 1763)	M, W	
144	02880	Poiana codabianca	<i>Buteo rufinus</i>	(Cretzschmar, 1829)	M, W irr, B irr	*
145	02870	Poiana	<i>Buteo buteo</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
Otidiformes						
Otididae						
146	04460	Otarda	<i>Otis tarda</i>	Linnaeus, 1758	M irr, W irr	
147	04440	Ubara africana	<i>Chlamydotis undulata</i>	(Jacquin, 1784)	A - 4	
148	04442	Ubara asiatica	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	(J. E. Gray, 1832)	A - 10	
149	04420	Gallina prataiola	<i>Tetrax tetrax</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr	
Gruiformes						
Rallidae						
150	04070	Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	Linnaeus, 1758	SB, M, W	
151	04210	Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
152	04100	Schiribilla	<i>Porzana parva</i>	(Scopoli, 1769)	M, B, W irr	
153	04110	Schiribilla grigiata	<i>Porzana pusilla</i>	(Pallas, 1776)	M, B irr	
154	04080	Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	(Linnaeus, 1766)	M, B, W irr	
155	04120	Voltolino striato	<i>Aenigmatolimnas marginalis</i>	(Hartlaub, 1857)	A - 1	
156	04270	Pollo sultano	<i>Porphyrio porphyrio</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr	
157	04272	Pollo sultano dorsoverde	<i>Porphyrio madagascariensis</i>	(Latham, 1801)	A - >15	
158	04250	Pollo sultano di Allen	<i>Porphyrio alleni</i>	Thomson, 1842	A - 8	
159	04260	Pollo sultano della Martinica	<i>Porphyrio martinicus</i>	(Linnaeus, 1766)	A - 2	
160	04240	Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W	
161	04310	Folaga crestata	<i>Fulica cristata</i>	J. F. Gmelin, 1789	A - 6	
162	04290	Folaga	<i>Fulica atra</i>	Linnaeus, 1758	SB, M, W	
Gruidae						
163	04410	Damigella della Numidia	<i>Grus virgo</i>	(Linnaeus, 1758)	A - 10	*
164	04330	Gru	<i>Grus grus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	*

Charadriiformes						
Turnicidae						
165	04000	Quaglia tridattila	<i>Turnix sylvaticus</i>	(Desfontaines, 1789)	(SB estinta)	
Burhinidae						
166	04590	Occhione	<i>Burhinus oedichnemus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
Haematopodidae						
167	04500	Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W	
Recurvirostridae						
168	04550	Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W	
169	04560	Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W	
Charadriidae						
170	04930	Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W, B	
171	04870	Pavoncella armata	<i>Vanellus spinosus</i>	(Linnaeus, 1758)	A - 4	
172	04910	Pavoncella gregaria	<i>Vanellus gregarius</i>	(Pallas, 1771)	M irr, W irr	
173	04920	Pavoncella codabianca	<i>Vanellus leucurus</i>	(Lichtenstein, 1823)	A - 4	
174	04850	Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
175	04842	Piviere orientale	<i>Pluvialis fulva</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	A - 13	*
176	04841	Piviere americano	<i>Pluvialis dominica</i>	(Stadius Muller, 1776)	A - 1	
177	04860	Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
178	04700	Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	Linnaeus, 1758	M, W	
179	04690	Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	Scopoli, 1786	M, B, W	
180	04760	Corriere di Kittlitz	<i>Charadrius pecuarius</i>	Temminck, 1823	A - 1	
181	04770	Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W	
182	04780	Corriere mongolo	<i>Charadrius mongolus</i>	Pallas, 1776	A - 1	
183	04790	Corriere di Leschenault	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Lesson, 1826	A - 5	
184	04800	Corriere asiatico	<i>Charadrius asiaticus</i>	Pallas, 1773	A - 4	
185	04820	Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	Linnaeus, 1758	M, B reg?, W irr	
Scolopacidae						
186	05290	Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W	
187	05180	Frullino	<i>Lymnocyptes minimus</i>	(Brünnich, 1764)	M, W	
188	05210	Beccaccino stenuro	<i>Gallinago stenura</i>	(Bonaparte, 1831)	A - 1	*
189	05200	Croccolone	<i>Gallinago media</i>	(Latham, 1787)	M, W irr	
190	05190	Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W, B irr	
191	05270	Limnodromo pettorossiccio	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	(Say, 1822)	A - 7	*
192	05320	Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W, B	
193	05340	Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
194	05380	Chiurlo piccolo	<i>Numenius phaeopus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W irr	
195	05400	Chiurlottello	<i>Numenius tenuirostris</i>	Vieillot, 1817	A	*
196	05410	Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W, B reg?	
197	05440	Piro piro codalunga	<i>Bartramia longicauda</i>	(Bechstein, 1812)	A - 10	
198	05450	Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	(Pallas, 1764)	M, W	
199	05460	Pettegola	<i>Tringa totanus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
200	05470	Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	(Bechstein, 1803)	M, W irr	
201	05480	Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	(Gunnerus, 1767)	M, W	

202	05510	Totano zampegialle minore	<i>Tringa flavipes</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	A - 10	
203	05530	Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	Linnaeus, 1758	M, W	
204	05540	Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	Linnaeus, 1758	M, W irr	
205	05600	Piro piro semipalmato	<i>Tringa semipalmata</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	A - 1	
206	05550	Piro piro del Terek	<i>Xenus cinereus</i>	(Güldenstädt, 1775)	M, W irr	
207	05560	Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W	
208	05570	Piro piro macchiato	<i>Actitis macularius</i>	(Linnaeus, 1766)	A - 3	
209	05610	Voltapietre	<i>Arenaria interpres</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
210	04960	Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
211	04970	Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	(Pallas, 1764)	M, W	
212	05000	Gambecchio collarosso	<i>Calidris ruficollis</i>	(Pallas, 1776)	A - 2	
213	05010	Gambecchio comune	<i>Calidris minuta</i>	(Leisler, 1812)	M, W	
214	05020	Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	(Leisler, 1812)	M, W	
215	05040	Gambecchio americano	<i>Calidris minutilla</i>	(Vieillot, 1819)	A - 1	
216	05050	Gambecchio di Bonaparte	<i>Calidris fuscicollis</i>	(Vieillot, 1819)	A - 1	
217	05060	Gambecchio di Baird	<i>Calidris bairdii</i>	(Coues, 1861)	A - 2	
218	05070	Piovanello pettorale	<i>Calidris melanotos</i>	(Vieillot, 1819)	M	
219	05090	Piovanello comune	<i>Calidris ferruginea</i>	(Pontoppidan, 1763)	M, W irr	
220	05100	Piovanello violetto	<i>Calidris maritima</i>	(Brünnich, 1764)	M irr, W irr	
221	05120	Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
222	05140	Gambecchio frullino	<i>Limicola falcinellus</i>	(Pontoppidan, 1763)	M, W irr	
223	05160	Piro piro fulvo	<i>Tryngites subruficollis</i>	(Vieillot, 1819)	A - 20	
224	05170	Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
225	05630	Falaropo di Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i>	(Vieillot, 1819)	A - 5	
226	05640	Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W irr	
227	05650	Falaropo beccolargo	<i>Phalaropus fulicarius</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W irr	
Glareolidae						
228	04640	Corrione biondo	<i>Cursorius cursor</i>	(Latham, 1787)	M irr	
229	04650	Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>	(Linnaeus, 1766)	M, B	
230	04670	Pernice di mare orientale	<i>Glareola nordmanni</i>	J. G. Fischer, 1842	A - 9	
Laridae						
231	06020	Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
232	06040	Gabbiano eburneo	<i>Pagophila eburnea</i>	(Phipps, 1774)	A - 2	
233	05790	Gabbiano di Sabine	<i>Xema sabini</i>	(Sabine, 1819)	A - 9	
234	05850	Gabbiano roseo	<i>Chroicocephalus genei</i>	(Brème, 1839)	B, M, W	*
235	05820	Gabbiano comune	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	(Linnaeus, 1766)	B, M, W	*
236	05840	Gabbiano testagrigia	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	(Vieillot, 1818)	A - 1	*
237	05780	Gabbianello	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	(Pallas, 1776)	M, W	
238	06010	Gabbiano di Ross	<i>Rhodostethia rosea</i>	(W. MacGillivray, 1824)	A - 3	
239	05760	Gabbiano sghignazzante	<i>Larus atricilla</i>	Linnaeus, 1758	A - 5	
240	05770	Gabbiano di Franklin	<i>Larus pipixcan</i>	Wagler, 1831	A - 3	
241	05880	Gabbiano corso	<i>Larus audouinii</i>	Payraudeau, 1826	B, M, W	
242	05750	Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	(Temminck, 1820)	M, W, B	

243	05730	Gabbiano di Pallas	<i>Larus ichthyaetus</i>	Pallas, 1773	M, W	
244	05900	Gavina	<i>Larus canus</i>	Linnaeus, 1758	M, W	
245	05890	Gavina americana	<i>Larus delawarensis</i>	Ord, 1815	A - 3	
246	06000	Mugnaiaccio	<i>Larus marinus</i>	Linnaeus, 1758	M, W	
247	05990	Gabbiano glauco	<i>Larus hyperboreus</i>	Gunnerus, 1767	A - 21	
248	05980	Gabbiano d'Islanda	<i>Larus glaucooides</i>	Meyer, 1822	A - 4	
249	05920	Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	Pontoppidan, 1763	M, W	
250	05927	Gabbiano reale pontico	<i>Larus cachinnans</i>	Pallas, 1811	M, W	
251	05926	Gabbiano reale	<i>Larus michahellis</i>	Naumann, 1840	SB, M, W	
252	05910	Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	Linnaeus, 1758	M, W	
253	06050	Sterna zampanere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	M, B, W irr	
254	06060	Sterna maggiore	<i>Hydroprogne caspia</i>	(Pallas, 1770)	M, W, B irr	
255	06090	Sterna di Rueppell	<i>Thalasseus bengalensis</i>	(Lesson, 1831)	M, B reg?	
256	06110	Beccapesci	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	(Latham, 1787)	M, W, B	
257	06240	Fratricello	<i>Sternula albifrons</i>	(Pallas, 1764)	M, B, W irr	
258	06230	Sterna scura	<i>Onychoprion fuscatus</i>	(Linnaeus, 1766)	A - 4	
259	06140	Sterna di Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Montagu, 1813	A - 4	
260	06150	Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W irr	
261	06160	Sterna codalunga	<i>Sterna paradisaea</i>	Pontoppidan, 1763	A - 19	
262	06260	Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybrida</i>	(Pallas, 1811)	M, B, W irr	
263	06280	Mignattino alibianche	<i>Chlidonias leucopterus</i>	(Temminck, 1815)	M, B, W irr	
264	06270	Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
Stercorariidae						
265	05690	Stercorario maggiore	<i>Stercorarius skua</i>	(Brünnich, 1764)	M, W	
266	05660	Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	(Temminck, 1815)	M, W	
267	05670	Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
268	05680	Labbo codalunga	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Vieillot, 1819	M, W irr?	
Alcidae						
269	06470	Gazza marina minore	<i>Alle alle</i>	(Linnaeus, 1758)	A - 5	
270	06340	Uria	<i>Uria aalge</i>	(Pontoppidan, 1763)	A - 9	
271	06360	Gazza marina	<i>Alca torda</i>	Linnaeus, 1758	M, W	
272	06540	Pulcinella di mare	<i>Fratercula arctica</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
Pterocliiformes						
Pteroclididae						
273	06630	Sirratte	<i>Syrhaptus paradoxus</i>	(Pallas, 1773)	A - 4 (XX sec.)	
274	06620	Grandule	<i>Pterocles alchata</i>	(Linnaeus, 1766)	A - 7	
275	06590	Grandule del Senegal	<i>Pterocles senegallus</i>	(Linnaeus, 1771)	A - 1	
Columbiformes						
Columbidae						
276	06650	Piccione selvatico	<i>Columba livia</i>	J. F. Gmelin, 1789	SB	
277	06680	Colombella	<i>Columba oenas</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W	
278	06700	Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W	
279	06870	Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
280	06890	Tortora orientale	<i>Streptopelia orientalis</i>	(Latham, 1790)	A - 2	

281	06840	Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	(Frivaldszky, 1838)	SB, M, W	
282	06900	Tortora delle palme	<i>Spilopelia senegalensis</i>	(Linnaeus, 1766)	SB, M irr	
Cuculiformes						
Cuculidae						
283	07160	Cuculo dal ciuffo	<i>Clamator glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
284	07280	Cuculo americano	<i>Coccyzus americanus</i>	(Linnaeus, 1758)	A - 7	
285	07270	Cuculo occhirossi	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	(Wilson, 1811)	A - 1	
286	07240	Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W irr	
Strigiformes						
Tytonidae						
287	07350	Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	(Scopoli, 1769)	SB, M reg? W reg?	
Strigidae						
288	07390	Assiolo	<i>Otus scops</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W	
289	07440	Gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr	
290	07610	Allocco	<i>Strix aluco</i>	Linnaeus, 1758	SB, M irr	
291	07650	Allocco degli Urali	<i>Strix uralensis</i>	Pallas, 1771	SB, M irr, W	
292	07510	Civetta nana	<i>Glaucidium passerinum</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr	
293	07570	Civetta	<i>Athene noctua</i>	(Scopoli, 1769)	SB, M irr	
294	07700	Civetta capogrosso	<i>Aegolius funereus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr	
295	07670	Gufo comune	<i>Asio otus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
296	07680	Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	(Pontoppidan, 1763)	M, W	*
Caprimulgiformes						
Caprimulgidae						
297	07790	Succiacapre collarosso	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Temminck, 1820	A - 3	
298	07780	Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W irr	
299	07810	Succiacapre isabellino	<i>Caprimulgus aegyptius</i>	Lichtenstein, 1823	A - 8	
Apodiformes						
Apodidae						
300	07980	Rondone maggiore	<i>Tachymarptis melba</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
301	07950	Rondone comune	<i>Apus apus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
302	07960	Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	(Shelley, 1870)	M, B, W irr	
303	08000	Rondone indiano	<i>Apus affinis</i>	(J. E. Gray, 1830)	A - 4	
Coraciiformes						
Coraciidae						
304	08410	Ghiandaia marina	<i>Coracias garrulus</i>	Linnaeus, 1758	M, B	
Alcedinidae						
305	08310	Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
306	08330	Martin pescatore bianconero	<i>Ceryle rudis</i>	(Linnaeus, 1758)	A - 1	
Meropidae						
307	08390	Gruccione egiziano	<i>Merops persicus</i>	Pallas, 1773	A - 16	
308	08400	Gruccione	<i>Merops apiaster</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W irr	
Bucerotiformes						
Upupidae						
309	08460	Upupa	<i>Upupa epops</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W	

Piciformes						
Picidae						
310	08480	Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W	
311	08870	Picchio rosso minore	<i>Dendrocopos minor</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr	
312	08830	Picchio rosso mezzano	<i>Dendrocopos medius</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr	
313	08840	Picchio dalmatino	<i>Dendrocopos leucotos</i>	(Bechstein, 1802)	SB, M irr, W irr	*
314	08760	Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W	
315	08980	Picchio tridattilo	<i>Picooides tridactylus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB	
316	08630	Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W	
317	08560	Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	Linnaeus, 1758	SB, M irr	
318	08550	Picchio cenerino	<i>Picus canus</i>	J. F. Gmelin, 1788	SB, M irr, W irr	
Falconiformes						
Falconidae						
319	03030	Grillaio	<i>Falco naumanni</i>	Fleischer, 1818	M, B, W	
320	03040	Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	Linnaeus, 1758	SB, M, W	
321	03070	Falco cuculo	<i>Falco vespertinus</i>	Linnaeus, 1766	M, B, W irr	
322	03080	Falco dell'Amur	<i>Falco amurensis</i>	Radde, 1863	A - 3	
323	03110	Falco della regina	<i>Falco eleonorae</i>	Gené, 1839	M, B, W irr	
324	03120	Falco unicolore	<i>Falco concolor</i>	Temminck, 1825	A - 2	
325	03090	Smeriglio	<i>Falco columbarius</i>	Linnaeus, 1758	M, W	
326	03100	Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W irr	
327	03140	Lanario	<i>Falco biarmicus</i>	Temminck, 1825	SB, M, W	
328	03160	Sacro	<i>Falco cherrug</i>	J. E. Gray, 1834	M, W	
329	03200	Falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	Tunstall, 1771	SB, M, W	
330	03210	Falcone della Barberia	<i>Falco pelegrinoides</i>	Temminck, 1829	A - 2	
Psittaciformes						
Psittacidae						
331	20390	Parrocchetto monaco	<i>Myiopsitta monachus</i>	(Boddaert, 1783)	SBN, M irr, W irr	
Psittaculidae						
332	07120	Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>	(Scopoli, 1769)	SBN, M irr, W irr	
Passeriformes						
Laniidae						
333	15130	Averla bruna	<i>Lanius cristatus</i>	Linnaeus, 1758	A - 1	
334	15150	Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W irr	
335	15140	Averla isabellina	<i>Lanius isabellinus</i>	Hemprich & Ehrenberg, 1833	A - 10	
336	15152	Averla codarossa	<i>Lanius phoenicuroides</i>	(Schalow, 1875)	A - 2	
337	15190	Averla cenerina	<i>Lanius minor</i>	J. F. Gmelin, 1788	M, B	
338	15200	Averla maggiore	<i>Lanius excubitor</i>	Linnaeus, 1758	M, W, B irr	*
339	32910	Averla meridionale	<i>Lanius meridionalis</i>	Temminck, 1820	M irr, W irr	*
340	-	Averla beccopallido	<i>Lanius pallidirostris</i>	Cassin, 1851	A - 4	
341	15230	Averla capirossa	<i>Lanius senator</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W irr	

Oriolidae						
342	15080	Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
Corvidae						
343	15390	Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W	
344	15490	Gazza	<i>Pica pica</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr	
345	15570	Nocciolaia	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr	
346	15590	Gracchio corallino	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr	
347	15580	Gracchio alpino	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	(Linnaeus, 1766)	SB, M irr, W irr	
348	15600	Taccola	<i>Corvus monedula</i>	Linnaeus, 1758	SB, M, W	
349	15630	Corvo comune	<i>Corvus frugilegus</i>	Linnaeus, 1758	M, W, B irr	
350	15671	Cornacchia nera	<i>Corvus corone</i>	Linnaeus, 1758	SB, M irr, W irr	
351	15673	Cornacchia grigia	<i>Corvus cornix</i>	Linnaeus, 1758	SB, M, W	
352	15720	Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>	Linnaeus, 1758	SB, M irr, W irr	
Bombycillidae						
353	10480	Beccofrusone	<i>Bombycilla garrulus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	
Paridae						
354	14610	Cincia mora	<i>Periparus ater</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W	
355	14540	Cincia dal ciuffo	<i>Lophophanes cristatus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr, W irr	
356	14410	Cincia dalmatina	<i>Poecile lugubris</i>	(Temminck, 1820)	A - 4	
357	14400	Cincia bigia	<i>Poecile palustris</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M irr, W irr	
358	14420	Cincia alpestre	<i>Poecile montanus</i>	(Conrad, 1827)	SB, M irr	
359	14622	Cinciarella algerina	<i>Cyanistes teneriffae</i>	(Lesson, 1831)	SB	
360	14620	Cinciarella	<i>Cyanistes caeruleus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W	
361	14640	Cinciallegria	<i>Parus major</i>	Linnaeus, 1758	SB, M, W	
Remizidae						
362	14900	Pendolino	<i>Remiz pendulinus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
Panuridae						
363	13640	Basettino	<i>Panurus biarmicus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W	
Alaudidae						
364	09580	Allodola beccocurvo	<i>Alaemon alaudipes</i>	(Desfontaines, 1789)	A - 1	
365	09560	Allodola del deserto minore	<i>Ammomanes cinctura</i>	(Gould, 1839)	A - 3	
366	09740	Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
367	09650	Calandra siberiana	<i>Alauda leucoptera</i>	Pallas, 1811	A - 9	
368	09760	Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W	
369	09720	Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W	
370	09780	Allodola golagiarella	<i>Eremophila alpestris</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr, W irr	
371	09680	Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	(Leisler, 1814)	M, B, W irr	
372	09620	Calandra asiatica	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	(Ménétries, 1832)	A - 4	

373	09610	Calandra	<i>Melanocorypha calandra</i>	(Linnaeus, 1766)	B, M, W	
374	09660	Calandra nera	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	(J. R. Forster, 1768)	A - 2	
375	09590	Allodola di Dupont	<i>Chersophilus duponti</i>	(Vieillot, 1824)	A - 2	
376	09700	Calandrina	<i>Alaudula rufescens</i>	(Vieillot, 1819)	M reg?, W irr	
Hirundinidae						
377	09810	Topino	<i>Riparia riparia</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
378	09920	Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W	
379	09910	Rondine montana	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	(Scopoli, 1769)	B, M, W	
380	10010	Balestruccio	<i>Delichon urbicum</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
381	09950	Rondine rossiccia	<i>Cecropis daurica</i>	(Laxmann, 1769)	M, B	
Cettiidae						
382	12200	Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	(Temminck, 1820)	SB, M, W	
Aegithalidae						
383	14370	Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W	
Phylloscopidae						
384	13120	Lù grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W irr	*
385	13110	Lù piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	(Vieillot, 1817)	B, M, W	
386	13115	Lù iberico	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Ticehurst, 1937	A - 3	
387	13070	Lù bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	(Vieillot, 1819)	M, B	
388	13072	Lù bianco orientale	<i>Phylloscopus orientalis</i>	(C. L. Brehm, 1855)	M irr	
389	13080	Lù verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	(Bechstein, 1793)	M, B, W irr	
390	13030	Lù scuro	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	(Blyth, 1842)	A - 9	
391	13010	Lù di Radde	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	(Radde, 1863)	A - 11	
392	12980	Lù di Pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>	(Pallas, 1811)	M irr, W irr	
393	13000	Lù forestiero	<i>Phylloscopus inornatus</i>	(Blyth, 1842)	M, W irr	
394	13002	Lù di Hume	<i>Phylloscopus humei</i>	(Brooks, 1878)	M irr, W irr	
395	12950	Lù boreale	<i>Phylloscopus borealis</i>	(Blasius, 1858)	A - 3	
396	12930	Lù verdastro	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	(Sundevall, 1837)	A - 1	
Acrocephalidae						
397	12530	Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
398	12410	Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	(Temminck, 1823)	B, M, W	
399	12420	Pagliarolo	<i>Acrocephalus paludicola</i>	(Vieillot, 1817)	M	*
400	12430	Forapaglie comune	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B	
401	12470	Cannaiola di Jerdon	<i>Acrocephalus agricola</i>	(Jerdon, 1845)	M reg?, W irr	
402	12480	Cannaiola di Blyth	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Blyth, 1849	A - 5	
403	12510	Cannaiola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	(Hermann, 1804)	M, B	
404	12500	Cannaiola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>	(Bechstein, 1798)	M, B	
405	12560	Canapino asiatico	<i>Iduna caligata</i>	(Lichtenstein, 1823)	A - 1	
406	12550	Canapino pallido orientale	<i>Iduna pallida</i>	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	M irr	
407	12552	Canapino pallido occidentale	<i>Iduna opaca</i>	(Cabanis, 1850)	A - 8	*
408	12580	Canapino levantino	<i>Hippolais olivetorum</i>	(Strickland, 1837)	A - 2	

409	12600	Canapino comune	<i>Hippolais polyglotta</i>	(Vieillot, 1817)	M, B	
410	12590	Canapino maggiore	<i>Hippolais icterina</i>	(Vieillot, 1817)	M, W irr	*
Locustellidae						
411	12360	Forapaglie macchiettato	<i>Locustella naevia</i>	(Boddaert, 1783)	M	
412	12370	Locustella fluviatile	<i>Locustella fluviatilis</i>	(Wolf, 1810)	A - 3	
413	12380	Salciaiola	<i>Locustella luscinioides</i>	(Savi, 1824)	M, B	
Cisticolidae						
414	12260	Beccamoschino	<i>Cisticola juncidis</i>	(Rafinesque, 1810)	B, M, W	
Leiotherichidae						
415	14070	Usignolo del Giappone	<i>Leiotherix lutea</i>	(Scopoli, 1786)	SBN, M irr, W irr	
Sylviidae						
416	12770	Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
417	12760	Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	(Boddaert, 1783)	M, B	
418	12730	Bigia padovana	<i>Sylvia nisoria</i>	(Bechstein, 1792)	M, B	
419	12740	Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
420	12720	Bigia grossa occidentale	<i>Sylvia hortensis</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	M, B	
421	12722	Bigia grossa orientale	<i>Sylvia crassirostris</i>	Cretzschmar, 1830	A - 7 (M?, B?)	*
422	12700	Sterpazzola del deserto	<i>Sylvia deserti</i>	(Loche, 1858)	A - 5	
423	12750	Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	Latham, 1787	M, B	
424	12620	Magnanina comune	<i>Sylvia undata</i>	(Boddaert, 1783)	B, M, W	
425	12610	Magnanina sarda	<i>Sylvia sarda</i>	Temminck, 1820	B, M, W	
426	12630	Magnanina di Tristram	<i>Sylvia deserticola</i>	Tristram, 1859	A - 1	
427	12640	Sterpazzola della Sardegna	<i>Sylvia conspicillata</i>	Temminck, 1820	M, B, W	
428	12650	Sterpazzolina comune	<i>Sylvia cantillans</i>	(Pallas, 1764)	M, B, W irr	
429	12652	Sterpazzolina di Moltoni	<i>Sylvia subalpina</i>	Temminck, 1820	M, B	
430	12670	Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	SB, M, W	
431	12660	Occhiocotto di Ménétries	<i>Sylvia mystacea</i>	Ménétries, 1832	A - 1	
432	12690	Bigia di Rueppell	<i>Sylvia ruppeli</i>	Temminck, 1823	M irr	
433	12680	Occhiocotto di Cipro	<i>Sylvia melanothorax</i>	Tristram, 1872	A - 1	
434	13700	Panuro di Webb	<i>Sinosuthora webbiana</i>	(Gould, 1852)	SBN, M irr	*
Regulidae						
435	13150	Fiorrancino	<i>Regulus ignicapilla</i>	(Temminck, 1820)	B, M, W	
436	13140	Regolo	<i>Regulus regulus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
Troglodytidae						
437	10660	Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
Sittidae						
438	14790	Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	Linnaeus, 1758	SB, M irr, W irr	
Tichodromidae						
439	14820	Picchio muraiolo	<i>Tichodroma muraria</i>	(Linnaeus, 1766)	B, M, W	
Certhiidae						
440	14860	Rampichino alpestre	<i>Certhia familiaris</i>	Linnaeus, 1758	SB, M irr, W irr	

441	14870	Rampichino comune	<i>Certhia brachydactyla</i>	C. L. Brehm, 1820	SB, M irr, W irr	
Sturnidae						
442	15840	Storno roseo	<i>Pastor roseus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W irr	*
443	15820	Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W	
444	15830	Storno nero	<i>Sturnus unicolor</i>	Temminck, 1820	SB, M irr	
Turdidae						
445	11710	Tordo siberiano	<i>Geokichla sibirica</i>	(Pallas, 1776)	A - 3	
446	11700	Tordo dorato	<i>Zoothera dauma</i>	(Latham, 1790)	A - 33	
447	11780	Tordo di Baird	<i>Catharus minimus</i>	(Lafresnaye, 1848)	A - 1	
448	11770	Tordo di Swainson	<i>Catharus ustulatus</i>	(Nuttall, 1840)	A - 3	
449	11760	Tordo di Pallas	<i>Catharus guttatus</i>	(Pallas, 1811)	A - 1	
450	11860	Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W	
451	11870	Merlo	<i>Turdus merula</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W	
452	11950	Tordo oscuro	<i>Turdus obscurus</i>	J. F. Gmelin, 1789	M irr, W irr	
453	11972	Tordo golanera	<i>Turdus atrogularis</i>	Jarocki, 1819	M irr, W irr	
454	11971	Tordo golarossa	<i>Turdus ruficollis</i>	Pallas, 1776	A - 1	
455	11961	Cesena di Naumann	<i>Turdus naumanni</i>	Temminck, 1820	A - 5	
456	11962	Cesena fosca	<i>Turdus eunomus</i>	Temminck, 1831	M irr, W irr	
457	11980	Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W	
458	12010	Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	Linnaeus, 1766	M, W, B irr	*
459	12000	Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	C. L. Brehm, 1831	M, B, W	
460	12020	Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	Linnaeus, 1758	SB, M, W	
Muscicapidae						
461	10950	Usignolo d'Africa	<i>Cercotrichas galactotes</i>	(Temminck, 1820)	M reg?	
462	13350	Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	(Pallas, 1764)	M, B, W irr	
463	10990	Pettirosso	<i>Erithacus rubecula</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
464	11060	Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W, B reg?	
465	11030	Usignolo maggiore	<i>Luscinia luscinia</i>	(Linnaeus, 1758)	M	
466	11040	Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	C. L. Brehm, 1831	M, B, W irr	
467	11050	Calliope	<i>Calliope calliope</i>	(Pallas, 1776)	A - 6	
468	11130	Codazzurro	<i>Tarsiger cyanurus</i>	(Pallas, 1773)	M irr, W irr	
469	13490	Balia nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>	(Pallas, 1764)	M, W irr, B irr	*
470	-	Balia dell'Atlante	<i>Ficedula speculigera</i>	(Bonaparte, 1850)	A - 1	*
471	13480	Balia dal collare	<i>Ficedula albicollis</i>	(Temminck, 1815)	M, B	
472	13470	Balia caucasica	<i>Ficedula semitorquata</i>	(Homeyer, 1885)	M reg?	
473	13440	Pigliamosche mugimaki	<i>Ficedula mugimaki</i>	(Temminck, 1836)	A - 1	
474	13430	Pigliamosche pettirosso	<i>Ficedula parva</i>	(Bechstein, 1792)	M, W irr	
475	11210	Codiroso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	(S. G. Gmelin, 1774)	M, B, W	
476	11220	Codiroso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
477	11270	Codiroso algerino	<i>Phoenicurus moussieri</i>	(Olphe-Galliard, 1852)	A - 9	
478	11620	Codirossone	<i>Monticola saxatilis</i>	(Linnaeus, 1766)	M, B, W irr	

479	11660	Passero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
480	11370	Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
481	11390	Saltimpalo	<i>Saxicola rubicola</i>	(Linnaeus, 1766)	B, M, W	
482	11394	Saltimpalo siberiano	<i>Saxicola maurus</i>	(Pallas, 1773)	M irr?, W irr	
483	11460	Culbianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
484	11440	Culbianco isabellino	<i>Oenanthe isabellina</i>	(Temminck, 1829)	M	
485	11500	Monachella del deserto	<i>Oenanthe deserti</i>	(Temminck, 1825)	M reg?, W irr	
486	11480	Monachella	<i>Oenanthe hispanica</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
487	11470	Monachella dorsonero	<i>Oenanthe pleschanka</i>	(Lepechin, 1770)	A - 11	
488	11580	Monachella nera	<i>Oenanthe leucura</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	M irr, W irr	*
489	11570	Monachella testabianca	<i>Oenanthe leucopyga</i>	(C. L. Brehm, 1855)	A - 3	
Cinclidae						
490	10500	Merlo acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W	
Passeridae						
491	15910	Passera oltremontana	<i>Passer domesticus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M irr	
492	15912	Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	(Vieillot, 1817)	SB, M	
493	15920	Passera sarda	<i>Passer hispaniolensis</i>	(Temminck, 1820)	SB, M, W	
494	15980	Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
495	16040	Passera lagia	<i>Petronia petronia</i>	(Linnaeus, 1766)	SB, M, W	
496	16110	Fringuello alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	(Linnaeus, 1766)	B, M, W	
Estrildidae						
497	20250	Bengalino comune	<i>Amandava amandava</i>	(Linnaeus, 1758)	SBN, M irr, W irr	
Prunellidae						
498	10940	Sordone	<i>Prunella collaris</i>	(Scopoli, 1769)	B, M, W	
499	10860	Passera scopaiola asiatica	<i>Prunella montanella</i>	(Pallas, 1776)	A - 3	
500	10840	Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W	
Motacillidae						
501	10170	Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W irr	
502	10180	Cutrettola testagiarella orientale	<i>Motacilla citreola</i>	Pallas, 1776	M	
503	10190	Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	Tunstall, 1771	B, M, W	
504	10200	Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W	
505	10020	Calandro maggiore	<i>Anthus richardi</i>	Vieillot, 1818	M, W	
506	10050	Calandro	<i>Anthus campestris</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
507	10110	Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W, B irr	*
508	10090	Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W irr	
509	10080	Prispolone indiano	<i>Anthus hodgsoni</i>	Richmond, 1907	M reg?, W irr	
510	10120	Pispola golarossa	<i>Anthus cervinus</i>	(Pallas, 1811)	M, W irr	
511	10144	Spioncello del Pacifico	<i>Anthus rubescens</i>	(Tunstall, 1771)	A - 2	
512	10140	Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>	(Linnaeus, 1758)	M, B, W	
513	10142	Spioncello marino	<i>Anthus petrosus</i>	(Montagu, 1798)	M irr?, W irr	

Fringillidae						
514	16360	Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W	
515	16380	Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	Linnaeus, 1758	M, W, B irr	*
516	17170	Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
517	16990	Ciuffolotto delle pinete	<i>Pinicola enucleator</i>	(Linnaeus, 1758)	A - 9	
518	17100	Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W	
519	16760	Trombettiere	<i>Bucanetes githagineus</i>	(Lichtenstein, 1823)	M reg?	
520	16790	Ciuffolotto scarlatto	<i>Carpodacus erythrinus</i>	(Pallas, 1770)	M, W irr, B reg?	*
521	16490	Verdone	<i>Chloris chloris</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
522	16620	Fanello nordico	<i>Linaria flavirostris</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr, W irr	
523	16600	Fanello	<i>Linaria cannabina</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
524	16630	Organetto	<i>Acanthis flammea</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M, W	
525	16680	Crociera delle pinete	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Borkhausen, 1793	A - 18	
526	16660	Crociera	<i>Loxia curvirostra</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W	
527	16650	Crociera fasciato	<i>Loxia leucoptera</i>	J. F. Gmelin, 1789	A	
528	16530	Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
529	16440	Venturone alpino	<i>Carduelis citrinella</i>	(Pallas, 1764)	B, M, W	
530	16442	Venturone corso	<i>Carduelis corsicana</i>	(Koenig, 1899)	SB, M irr, W irr	
531	16400	Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	(Linnaeus, 1766)	B, M, W	
532	16540	Lucherino	<i>Spinus spinus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
Icteridae						
533	18970	Bobolink	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	(Linnaeus, 1758)	A - 1	
Emberizidae						
534	18820	Strillozzo	<i>Emberiza calandra</i>	Linnaeus, 1758	SB, M, W	
535	18570	Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	Linnaeus, 1758	B, M, W	
536	18560	Zigolo golarossa	<i>Emberiza leucocephalos</i>	S. G. Gmelin, 1771	M, W	
537	18600	Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	Linnaeus, 1766	B, M, W	
538	18660	Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	Linnaeus, 1758	M, B, W irr	
539	18680	Ortolano grigio	<i>Emberiza caesia</i>	Cretzschmar, 1827	A - 29	
540	18580	Zigolo nero	<i>Emberiza cirrus</i>	Linnaeus, 1766	SB, M, W	
541	18740	Zigolo minore	<i>Emberiza pusilla</i>	Pallas, 1776	M, W irr	
542	18730	Zigolo boschereccio	<i>Emberiza rustica</i>	Pallas, 1776	M reg?, W irr	
543	18760	Zigolo dal collare	<i>Emberiza aureola</i>	Pallas, 1773	A - 25	
544	18810	Zigolo capinero	<i>Emberiza melanocephala</i>	Scopoli, 1769	M, B, W irr	
545	18800	Zigolo testaranciata	<i>Emberiza bruniceps</i>	Brandt, 1841	A - 18	
546	18770	Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W	
Calcaridae						
547	18470	Zigolo della Lapponia	<i>Calcarius lapponicus</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg?, W irr	
548	18500	Zigolo delle nevi	<i>Plectrophenax nivalis</i>	(Linnaeus, 1758)	M, W	

NOTE: qualora non diversamente indicato i dati sono tratti da Brichetti & Fracasso 2003-2015. Rispetto a questa lista abbiamo ora considerato specie separate *Porphyrio madagascariensis*, *Lanius phoenicuroides* e *Lanius pallidirostris* e aggiornato il numero delle segnalazioni di taxon accidentali in accordo con gli ultimi report COI (Janni & Fracasso 2015 e in stampa. *Avocetta* 39: 37-40 e 40).

Anser fabalis. Inclusive *A. f. rossicus* e *A. f. serrirostris*.
Anser anser. Re/introdotta in alcune regioni settentrionali.
Anas penelope. Casi di nidificazione possibilmente riferibili a individui menomati non in grado di migrare.
Oxyura leucocephala. B estinta (Sardegna).
Francolinus francolinus. SB reintrodotta (Toscana), estinta (Sicilia).
Diomedea dabbenena. Già *Diomedea exulans dabbenena*.
Thalassarche melanophris. Da aggiungere 2 segnalazioni attribuite genericamente a *Thalassarche* sp.
Calonectris borealis. Prima segnalazione di nidificazione da sottoporre al parere della COI.
Puffinus baroli. Anche *P. assimilis baroli*, *P. lherminieri baroli*.
Egretta gularis. B irr: coppie miste con *E. garzetta*.
Morus bassanus. Prima segnalazione di nidificazione da sottoporre al parere della COI.
Pandion haliaetus. B re/introdotta (Toscana), estinta (Sardegna).
Gypaetus barbatus. SB reintrodotta (Alpi), estinta (Sardegna).
Gyps fulvus. Re/introdotta Prealpi orientali, Appennino centro-meridionale, Sicilia. Presenza regolare e consistente sulle Alpi occidentali di individui reintrodotti in Francia.
Aegypius monachus. SB estinta (Sardegna).
Hieraaetus pennatus. Prima segnalazione di nidificazione da sottoporre al parere della COI.
Haliaeetus albicilla. SB estinta (Sardegna).
Buteo rufinus. Prima segnalazione di nidificazione da sottoporre al parere della COI.
Grus virgo. B estinta (Lampedusa, Is. Pelagie).
Grus grus. B estinta (Veneto).
Phuvalis fulva. Da aggiungere una segnalazione attribuita a *P. fulva/P. dominica*.
Gallinago stenura. Da aggiungere una segnalazione attribuita a *G. stenura/G. megala*.
Limnodromus scolopaceus. Da aggiungere 3 segnalazioni attribuite a *L. scolopaceus/L. griseus*.
Numenius tenuirostris. M, W (XX secolo, ultime segnalazioni certe nel 1995-96. La recente mancanza di segnalazioni è imputabile al drammatico declino della specie.
Chroicocephalus genei, *C. ridibundus*, *C. cirrocephalus*. Attribuzione generica in accordo con la lista BOU (Harrop *et al.* 2013).
Asio flammeus. B irr da confermare.
Dendrocopos leucotos. M irr, W irr da riferirsi a *D. l. leucotos*.
Lanius excubitor. Prima segnalazione di nidificazione da sottoporre al parere della COI.

Lanius meridionalis. Inclusive *L. m. algeriensis* e *L. m. elegans*, quest'ultima considerata anche specie separata.
Phylloscopus trochilus. B irr (Alpi) da confermare.
Acrocephalus paludicola. B estinta da confermare.
Iduna opaca. Presunti casi di nidificazione in Sardegna non documentati.
Hippolais icterina. B irr (Alpi) da confermare.
Sylvia crassirostris. Prima segnalazione di nidificazione da sottoporre al parere della COI.
Sinosuthora webbiana. Per semplicità viene mantenuta questa attribuzione specifica, anche se la situazione tassonomica del gruppo *webbiana/alphonsiana* appare particolarmente complessa ed ancora mal definita per quanto concerne le popolazioni presenti negli areali naturali (Yeung *et al.* 2011) ed ulteriormente complicata dal probabile rimescolamento intervenuto all'interno dei contingenti immessi nel sito italiano (Crotti *et al.* 2010).
Pastor roseus. B irr (Veneto XIX secolo).
Turdus iliacus. Casi di nidificazione quasi certamente riferibili a soggetti fuggiti o liberati dalla cattività.
Ficedula hypoleuca. Prima segnalazione di nidificazione da sottoporre al parere della COI.
Ficedula speculigera. Altre segnalazioni da confermare in quanto non sottoposte alla COI o in attesa di parere.
Oenanthe leucura. B estinta da confermare.
Anthus pratensis. Prima segnalazione di nidificazione da sottoporre al parere della COI.
Fringilla montifringilla. Casi di nidificazione quasi certamente riferibili a soggetti fuggiti o liberati dalla cattività.
Carpodacus erythrinus. Prima segnalazione di nidificazione da sottoporre al parere della COI.

Ringraziamenti

Desideriamo ringraziare Giovanni Boano per l'accurata revisione del lavoro e per gli utili suggerimenti.

BIBLIOGRAFIA

- Aimassi G., 2015 – The original description of Bonelli's Eagle *Aquila fasciata* Vieillot (Aves: Accipitridae). *Zoological Bibliography*, 4: 1-14.
 Arrigoni degli Oddi E., 1913 – Elenco degli uccelli italiani per conoscere a prima vista lo stato esatto di ogni specie. Riveduto al 31 dicembre 1912. *Boll. Ministero Agricoltura Industria e Commercio*, 12/C.
 Baccetti N., Fracasso G. & Gotti C., 2014 – La lista CI-SO-COI degli uccelli italiani - Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie "di servizio" (cat. D, E, X). *Avocetta*, 38: 1-21.
 Brichetti P. & Fracasso G., 2003-2014 – Ornitologia Italiana. *Alberto Perdisa Editore*, Bologna, 1-8.
 Brichetti P. & Fracasso G., 2015 – Ornitologia Italiana. *Edizioni Belvedere*, Latina, 9.
 Brichetti P. & Massa B., 1984 – Check-list degli uccelli italiani. *Riv. ital. Orn.*, 54: 3-37.
 Brichetti P. & Massa B., 1987 – Aggiunte e rettifiche alla check-list degli uccelli italiani. 1. *Riv. ital. Orn.*, 57: 157-160.

- Brichetti P. & Massa B., 1991 – Aggiunte e rettifiche alla check-list degli uccelli italiani. 2. *Riv. ital. Orn.*, 61: 3-9.
- Brichetti P. & Massa B., 1998 – Check-list degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997. *Riv. ital. Orn.*, 68: 129-152.
- Bruce M., 2003 – A brief history of classifying birds. In: del Hoyo J., Elliott A. & Christie D.A. (eds.). *Handbook of the Birds of the World. Lynx Edicions*, Barcellona. 8: 11-43.
- Collinson M., 2001 – Shifting sands: taxonomic changes in the world of the field ornithologist. *British Birds*, 94: 2-27.
- del Hoyo J. & Collar N. J., 2014 – HBW and BirdLife international illustrated checklist of the birds of the world. Non-passerines. *Lynx Edicions*, Barcellona, 1.
- del Hoyo J. *et al.* (eds.), 1992-2011 – Handbook of the Birds of the World. *Lynx Edicions*, Barcellona, 1-16.
- Dickinson E. C. & Christidis L., 2014 – The Howard & Moore Complete Checklist of the Birds of the World. 4th edition, Passerines, Vol. 2. *Aves Press*, Eastbourne.
- Dickinson E. C. & Remsen Jr. J. V., 2013 – The Howard & Moore Complete Checklist of the Birds of the World. 4th edition. Non-passerines, Vol. 1. *Aves Press*, Eastbourne.
- Fasola M. & Brichetti P. 1984 – **Proposte per una terminologia ornitologica.** *Avocetta* 8: 119-125.
- Fracasso G., Baccetti N. & Serra L., 2009 – La Lista CI-SO-COI degli Uccelli Italiani. Parte prima: liste A, B e C. *Avocetta*, 33: 5-24.
- Gill F. & Donsker D. (eds). 2015 – IOC World Bird List (v 5.4). <<http://www.worldbirdnames.org/>>
- Mayr E. & Bock W. J., 1994 – Provisional classifications v standard avian sequences: heuristic and communication in ornithology. *Ibis*, 136: 12-18.
- Moltoni E., 1945 – Elenco degli Uccelli italiani con l'attuale nome scientifico e relativa pronuncia in riguardo all'accento. *Riv. ital. Orn.*, 15: 33-78.
- Moltoni E. & Brichetti P., 1978 – Elenco degli Uccelli italiani. *Riv. ital. Orn.*, 48: 65-142.
- Padial J. M. & De La Riva I., 2006 – Taxonomic inflation and the stability of species lists: the perils of ostrich's behavior. *Syst. Biol.*, 55: 859-867.
- Vaurie C., 1959, 1965 – **The Birds of the Palearctic Fauna.** I. Passeriformes. II Non-Passeriformes. *Witherby*, London.
- Voous K. H., 1973 – List of recent Holarctic bird species. Non-Passerines. *Ibis*, 115: 612-638.
- Voous K. H., 1977 – List of recent Holarctic bird species. Passerines. *Ibis*, 119: 223-250, 376-406.
- Walters M., 2003 – A concise history of ornithology. *Christopher Helm*, London.